

QCM

1° Quels sont les critères de réussite d'un ASP :

- ☒ a- bonne visibilité du bord externe des psoas
- ☒ b- netteté des gaz intestinaux
- ☒ c- visibilité des 11^{ème} articulations costo-vertébrales
- ☒ d- visibilité du bord inférieur de la symphyse pubienne
- e- visibilité du bord supérieur de la symphyse pubienne

2° L'insuffisance rénale contre-indique la réalisation de :

- a-ASP ☒ b-UIV ☒ c-UCR d-TDM e-Uroscanner

3° Quelles sont les principales indications de l'uroscanner :

- ☒ a- RVU b- hématurie c- maladie lithiasique d- étiologie d'une hydronéphrose
- e- étiologie d'une hydrocéphalie

4° Les niveaux hydro- aériques d'un syndrome occlusif sont visibles :

- ☒ a- ASP couché b- ASP debout c- Thorax debout ☒ d- Echographie abdominale
- ☒ e- TDM abdominale

5° Le diagnostic d'un volvulus sur bride est évoqué sur l'ASP devant :

- ☒ a- niveaux hydro- aériques plus larges que hauts
- b- niveaux hydro- aériques plus haut que larges
- ☒ c- image en U renversé d- pneumopéritoine ☒ e- distension intestinale diffuse

6° Une douleur abdominale diffuse fait évoquer :

- a- une appendicite b- une cholécystite aiguë ☒ c- une perforation d'un ulcère duodénal
- ☒ d- un iléus biliaire e- une torsion d'un kyste ovarien

7° L'examen de choix dans l'exploration des voies biliaires est :

- ☒ a- Angiographie numérisée ☒ b- Cholangio IRM c- Angio IRM d- Angio TDM ☒ e- ASP

8° Devant un ictère chirurgical, à quoi pensez-vous :

- a- Lithiase de la VBP b- Cancer de la tête du pancréas c- Tumeur obstructive du cholédoque
- d- Angiome hépatique ☒ e- Tumeur de la queue du pancréas

9° Devant une masse hépatique, quel(s) examen(s) faut-il demander :

- a- Cholangio IRM ☒ b- Angio TDM c- Angio IRM ☒ d- Echo-doppler hépatique e- CPRE

10° La valeur de l'index cardio- thoracique chez l'adulte est de :

- a- 0,4 ☒ b- 0,5 c- 0,6 ☒ d- 0,66 e- 0,7

11° Quelle est l'incidence qui dégage la vraie face du cœur :

- a- Face b- profil droit ☒ c- oblique antérieur droit ☒ d- oblique antérieur gauche e- Profil gauche

12° L'échocardiographie est une technique qui :

- a- est irradiante ☒ b- est d'usage courant c- est invasive
- d- apporte peu de renseignements morphologiques et fonctionnels
- ☒ e- apporte beaucoup de renseignements morphologiques et fonctionnels

13° Un syndrome pleuro pariétal associé :

- a- une opacité centrale b- un bronchogramme aérique
- c- un raccordement en pente douce à la paroi thoracique
- ☒ d- un raccordement à pente aiguë à la paroi thoracique ☒ e- une opacité périphérique

14° Une radiographie thoracique de bonne qualité doit être faite en :

- ☒ a- position debout ☒ b- inspiration profond c- décubitus dorsal ☒ d- expiration e- position couchée

15° L'examen adapté à l'exploration du parenchyme pulmonaire est :

- ☒ a- l'échographie ☒ b- le scanner ☒ c- la radiographie standard d- le lavement baryté e- l'UiV

16° Une lacune osseuse maligne présente :

- a- limites nettes ☒ b- limites floues c- réaction périostée spiculaire
- ☒ d- interruption de la corticale e- condensation périphérique

17° Une spondylodiscite infectieuse :

- a- n'est pas une urgence diagnostique et thérapeutique
- b- se traduit par un pincement discal avec érosions des plateaux vertébraux
- c- calcifications discales d- des abcès vertébraux sont retrouvés
- e- se traduit par un élargissement du disque avec condensation des plateaux vertébraux

18° Le polytraumatisé dont le pronostic vital est sauvegardé, par quel(s) examen(s) est-il exploré :

- a- radiologie conventionnelle ☒ b- TDM cérébro-spinal c- Echographie abdomino-pelvienne
- d- IRM cérébrale ou médullaire e- Exploration vasculaire

19° Deux de ces examens, actuellement ne sont plus demandés :

- ☒ a- Saccoradiculographie b- Angioscanner ☒ c- Myélographie conventionnelle
- d- Myéloscanner e- Doppler trans-crânien

20° En imagerie neurologique et chirurgicale, les examens les plus demandés sont :

- ☒ a- TDM b- Radiologie conventionnelle c- Angiographie numérisée cérébrale ou médullaire
- ☒ d- IRM e- Scintigraphie